

La mue

La mue permet au lapin de renouveler sa fourrure. Les poils morts tombent brusquement, laissant la place à de nouveaux qui constitueront une fourrure plus ou moins dense, adaptée à la saison.



Les lapins adultes muent généralement tous les trois mois, même si seule une mue sur deux se remarque. Quel que soit leur habitat, tous les lapins muent, même si la mue est plus forte chez ceux vivant en extérieur. La progression de la mue est souvent visible sur le dos et les flancs mais a lieu sur tout le corps, y compris le museau, les pattes et le ventre qui sont par conséquent à ne pas négliger lors du toilettage. Le poil peut subir d'importantes variations de couleur liées à la présence ou non de sous poil.

Pendant la mue, le lapin absorbe des poils en faisant sa toilette ou celle d'un congénère. Ceux-ci peuvent s'agglomérer en se mêlant aux aliments secs présents dans l'estomac et former des amas allant du chapelet de crottes, qui sera évacué naturellement, au trichobézoard qui nécessitera un traitement médical. Pour limiter la quantité de poils avalée par le lapin lors de la mue, il faut adapter son alimentation, et aussi prendre le temps de s'occuper de sa fourrure.



Le meilleur moyen de lutter contre les trichobézoards est de favoriser leur élimination naturelle grâce à un système digestif dynamique et à une bonne hydratation. L'apport en fibres indigestibles est indispensable pour assurer un bon transit et éliminer les poils avalés. Il faut vérifier que l'apport en foin soit suffisant et donner au lapin des végétaux riches en fibres tels que des feuillages (principalement des salades sauf laitue pommée et iceberg : endive, feuille de chêne, batavia, romaine, chicorée, pissenlit, etc.) ou de l'herbe non traitée. La consommation d'eau doit aussi être surveillée (environ 100 ml/kg par jour). Si le lapin boit peu, on peut lui proposer la verdure humide ou ajouter un peu de jus d'ananas frais à son eau. En complément de ces mesures, des comprimés Oxbow « Papaya Fruit plus » peuvent être donnés au lapin. Si vous suspectez un ralentissement du transit, il est impératif de consulter votre vétérinaire.



Pour limiter la quantité de poils ingérée, on peut aider le lapin en supprimant les touffes les plus visibles manuellement et en brossant le reste de la fourrure. Une brosse souple suffit pour les poils courts mais pour des lapins au pelage plus long ou plus dense, le furminator peut s'avérer utile. Ce peigne possède des dents courtes et fines ainsi qu'une lame près de la base qui coupe les nœuds gênants lors du démêlage. Attention toutefois à ne pas l'utiliser trop fort pour ne pas dépiler le lapin. Les lapins angoras constituent un cas à part : les instruments classiques ne suffisent plus. Il est conseillé de les brosser de manière quotidienne (même hors de la mue) et de couper les poils afin qu'ils ne soient pas trop longs et ne forment pas de nœuds.

Enfin, en cas de soins plus importants (tonte ou nœuds près de parties sensibles), il ne faut pas hésiter à consulter un vétérinaire.

Solène Bray